

วิธีลด 4 วิธีลด

- 1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
- 2. ใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดเชื้อ
- 3. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสเลือด
- 4. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสของมีคม

วิธีลด 4 วิธีลด

- 1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
- 2. ใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดเชื้อ
- 3. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสเลือด
- 4. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสของมีคม

วิธีลด 4 วิธีลด

- 1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
- 2. ใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดเชื้อ
- 3. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสเลือด
- 4. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสของมีคม

โรคเอดส์

โรคเอดส์ (AIDS) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส HIV ซึ่งสามารถติดต่อได้ผ่านทางเลือด น้ำอสุจิ และน้ำนมแม่

การติดต่อ

- 1. ใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดเชื้อ
- 2. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสเลือด
- 3. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสของมีคม
- 4. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสของมีคม

การป้องกัน

- 1. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
- 2. ใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ปลอดเชื้อ
- 3. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสเลือด
- 4. ใช้ถุงมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสของมีคม